

**HƯỚNG DẪN**  
**BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG NẮNG NÓNG,**  
**DỊCH BỆNH CHO ĐÀN VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN**  
*(Kèm theo Công văn số /UBND-KT ngày /7/2025 của UBND xã)*

## **I. Đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm**

### **1. Thức ăn, nước uống**

Những ngày nắng nóng, thực hiện chế độ chuyển bữa ăn, thức ăn tinh, thức ăn hỗn hợp chuyển sang cho ăn vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Tăng cường khẩu phần thức ăn xanh như rau cỏ tươi, củ, quả và các loại vitamin... tăng chất đạm, giảm tinh bột, mỡ, đường trong khẩu phần ăn cho gia súc, gia cầm.

Đảm bảo thường xuyên có đủ nước uống cho gia súc, gia cầm, không làm ảm ướt nền chuồng. Lắp các thiết bị van nước tự động để luôn cấp đủ nước sạch cho gia súc, gia cầm uống.

### **2. Quản lý nuôi dưỡng**

**Đối với trâu, bò, dê chăn thả:** Những ngày trời nắng nóng, buổi sáng đi chăn thả sớm và về sớm; buổi chiều chăn thả muộn, về muộn, đặc biệt chú ý chăm sóc gia súc non. Nếu có điều kiện nên di chuyển đàn gia súc đến nơi có nguồn nước và bổ sung thức ăn tại chuồng.

**Đối với gia cầm:** Nuôi nhốt với mật độ vừa phải, điều chỉnh mật độ theo tốc độ lớn và biểu hiện của của đàn gia cầm. Nếu thời tiết quá nóng có thể chăn thả ra vườn, gốc cây quanh chuồng. Đối với gà đẻ nên tránh nuôi quá béo bằng cách giảm bớt hàm lượng năng lượng trong khẩu phần, cho ăn thêm rau xanh.

**Đối với lợn:** Mật độ nuôi nhốt đối với lợn nái là 3 - 4 m<sup>2</sup>/con; lợn thịt là 2 m<sup>2</sup>/con; cần cho lợn uống đủ nước.

### **3. Về quản lý chuồng trại chăn nuôi**

Chuồng trại cần được giữ vệ sinh sạch sẽ và thông thoáng, hàng ngày thu gom phân và rác thải, thực hiện ủ phân sinh học, không xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường. Vệ sinh máng ăn, máng uống thường xuyên không để dư thừa thức ăn trong máng gây ôi thiu, ảm mốc. Những ngày nhiệt độ cao nên phun nước lên mái chuồng, đập cành lá lên mái để hạ bớt nhiệt tiêu khí hậu chuồng nuôi. Đối với kiểu chuồng hở (thông thoáng tự nhiên) cần làm rèm che xung quanh, những ngày nắng nóng có thể mở lên để thoát nhiệt và tạo độ thông thoáng chuồng nuôi. Trồng cây xanh xung quanh chuồng, để tán cao, tạo bóng mát cho mái chuồng trại đảm bảo lưu thông gió dưới mái chuồng; chuồng nuôi có bố trí hệ thống cửa để thông gió, nếu có điều kiện bổ sung quạt thông gió, hệ thống phun sương.

### **4. Vệ sinh phòng bệnh**

Đảm bảo nền chuồng sạch, khô ráo, cống rãnh không đọng phân, nước thải nhằm hạn chế phát sinh ruồi, muỗi và các sinh vật gây bệnh khác; Tiêm đầy đủ các loại vacxin cho gia súc, gia cầm để tăng cường khả năng miễn dịch cho đàn vật nuôi; định kỳ tẩy giun, sán cho vật nuôi, phun thuốc khử trùng, diệt ve,

mòng, ruồi, muỗi, bọ mạt... là những tác nhân truyền và gây bệnh; phát hiện sớm các loại gia súc, gia cầm bị ốm, bị bệnh để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời tránh để bệnh lây lan. Cần quan tâm phòng các bệnh liên quan đến đường tiêu hoá và hô hấp bằng cách sử dụng kháng sinh ở liều phòng bệnh.

Những đợt nắng nóng kéo dài, đàn gia súc, gia cầm thường mệt mỏi, sức đề kháng giảm, giảm năng suất, tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là gia súc non. Vì vậy cần bổ sung khoáng, các loại vitamin và dinh dưỡng cho đàn vật nuôi để tăng sức đề kháng.

## **II. Đối với thủy sản**

**1.** Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng bệnh cho thủy sản nuôi: Làm tốt công tác cải tạo ao nuôi sau mỗi vụ thu hoạch hoặc trước vụ thả giống; cá giống cần đảm bảo khỏe mạnh, đều cỡ, trước khi thả giống cần tắm cho cá bằng nước muối với nồng độ 2 - 3% trong 5 - 7 phút; trong quá trình nuôi định kỳ bón vôi 2 tuần 1 lần với liều lượng 2 - 3 kg/100 m<sup>3</sup> nước ao vào buổi chiều tối nhằm làm sạch môi trường nước hạn chế mầm bệnh.

**2.** Phổ biến và hướng dẫn người nuôi thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật ứng phó với nắng nóng và biến động bất thường của thời tiết, ổn định môi trường ao nuôi, nâng cao sức đề kháng cho thủy sản nuôi. Đặc biệt chú ý về khẩu phần ăn, chế độ cho ăn cho phù hợp (giảm lượng thức ăn còn 1/2; 2/3 so với bình thường khi nhiệt độ trên 35<sup>0</sup>C); thường xuyên quan sát diễn biến của môi trường và thủy sản nuôi, nhất là vào sáng sớm và chiều tối để có biện pháp xử lý kịp thời. Duy trì mực nước 1,5m trở lên tránh nắng nóng, tăng cường ôxy cho cá nuôi bằng nguồn nước, sục khí thời điểm từ đêm 12 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Che và chống nắng cho cá bằng cách trồng cây bóng mát quanh bờ ao, thả bèo 1/3 ao làm chỗ trú nắng cho cá với ao nuôi thương phẩm; che bạt, lưới đen đối diện tích ao nhỏ, nông và ao nuôi cá hương, cá giống; hạ lồng nuôi xuống sâu hơn, phủ lưới 1/2 - 1/3 diện lồng để tránh nắng cho cá với lồng nuôi trong hồ. Cần thường xuyên quan sát hoạt động bất môi và bơi lội của cá đặc biệt là thời điểm sáng sớm. Khi ao có dấu hiệu bất thường: cá mắc bệnh, chết cần giảm khẩu phần ăn và có biện pháp xử lý kịp thời.

**3.** Riêng đối với bệnh xuất huyết trên cá rô phi: Mùa hè là thời điểm bệnh có khả năng bùng phát mạnh. Ở vùng nuôi tập trung cá rô phi đơn tính người nuôi cần làm tốt công tác cải tạo và vệ sinh ao nuôi, sử dụng: vôi bột, BKC, chế phẩm sinh học... để xử lý nước ao. Ngoài ra, cần cho cá ăn thuốc phòng bệnh định kỳ 1 tháng 1 lần và bổ sung vitamin C, Beta - Glucan trong khẩu phần ăn. Duy trì mật độ nuôi từ 1- 2 con/m<sup>2</sup> , tránh nuôi với mật độ cao để gây bùng phát dịch bệnh trong mùa nắng nóng kéo dài.